

OCUflash®

Natrii chloridum 7 mg/ml

Acu pilieni, šķīdums

1. Kas ir OCUflash un kādam nolūkam to lieto

OCUflash preparāts ir īpašs acu (izotonisks, buferēts) šķīdums, kura sastāvā kā palīgviela iekļauts *Euphrasia officinalis*. To paredzēts iepilināt acī vai izmantot kā medicīnisku acu skalošanas līdzekli. *Euphrasia officinalis* ekstrakts acī darbojas kā pretiekaisuma un savelkoša viela. Šīs *Euphrasia officinalis* īpašības jau izsenis izmanto acu atslābināšanai un neinfekciozu acs plakstiņa un acs konjunktīvas iekaisumu profilaksei un atbalstošai ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms OCUflash lietošanas

OCUflash nedrīkst lietot, ja Jums ir alerģija pret kādu no šī produkta sastāvdaļām.

OCUflash var lietot pieaugušie, pusaudži un bērni. Preparāta drošuma dēļ to var lietot jaundzimušajiem, bērniem, kurus baro ar krūti, grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Ja vienlaikus lieto kādus citus acu pilienus vai acu ziedes, ir atbilstoši ievietot tos acī ne agrāk kā 5 minūtes pēc OCUflash lietošanas.

3. Kā lietot OCUflash

OCUflash ir ideāli izmantojams kā medicīnisks mazgāšanas šķīdums svešķermeņu un/vai ķīmikāliju izskalošanai no acs. Bez konsultēšanās ar ārstu to var lietot kā vienkāršu vienreizēju līdzekli acu mazgāšanai, ko paredzēts iepilināt acī vai izmantot kompresēs uz plakstiņiem. Šo preparātu lieto, ja acīs ir diskomforta sajūta, piemēram, durstoša sajūta, nieze vai sajūta, ka acī atrodas svešķermeņi. Praksē OCUflash ir ideāli piemērots, lai to lietotu:

1. acs skalošanai pēc tonometrijas un gonioskopijas;
2. acs skalošanai, lai atbrīvotos no svešķermeņiem, putekļiem un hlorēta ūdens;
3. fluoresceīna šķīdumu atlieku aizskalošanai;
4. gļotu un strutainu sekrētu aizskalošanai;
5. acs skalošanai pēc cieto kontaktlēcu valkāšanas;
6. kā teicamu pirmās palīdzības līdzekli pēc vieglas konjunktīvas un acs erozijas skābju un sārmu darbības rezultātā (balinātājs, kaļķis);
7. kā palīgvielu dažu, galvenokārt neinfekciozu, konjunktīvas iekaisumu un hronisku konjunktīvas infekciju gadījumā;
8. kā piemērota viela kosmētikas preparātu notīrīšanai no acu zonas (plakstiņiem un skropstām).

Lai mazinātu acu kairinājumu un neinfekciozu konjunktīvas un plakstiņu iekaisumu atbalstošai ārstēšanai iepilināt skartās acs (acu) konjunktīvas maisiņā 1-2 pilienus 1-4x dienā. Lai no acs izskalotu svešķermeņi, lietojiet šķīdumu, līdz svešķermeņi izskalots, un pēc tam līdz traucējumu mazināšanai.

Uzmanību pirms lietošanas

Pēc atvēršanas OCUflash ir gatavs lietošanai acī. Pacients noskrūvē drošības vāciņu, nedaudz atliec galvu atpakaļ, apgriez pudelīti no augšas uz leju un saspiežot plastmasas pudelīti, iepilina acs apakšējā konjunktīvas maisiņā noteikto skaitu pilienus. Lietotais šķīduma daudzums ir atkarīgs no lietošanas veida. Iepilini vai skalojiet skarto aci ar šķīdumu pēc vajadzības (izdalītā šķīduma daudzumu regulē, spiežot pudelīti). Plakstiņu iekaisuma gadījumā šķīdumu var izmantot arī komprešu gatavošanai. Lietošanas laikā ar pipeti nedrīkst pieskarties acij, plakstiņam vai skropstām. Visbeidzot, lai novērstu iespējamu kontamināciju, stingri jāaizskrūvē vāciņš. Pudelīte jāuzglabā vertikāli.

Brīdinājumi

Ja simptomi, kuru dēļ preparāts lietots, neizzūd un saglabājās vairāk kā divas dienas laikā vai pat pasliktinās, konsultējieties ar Jūsu acu ārstu.

OCUflash neietekmē koncentrēšanās spēju, vadot transportlīdzekļus, rīkojoties ar aprīkojumu un strādājot augstumā, kad nepieciešama pastiprināta modrība. Tomēr pēc iepilināšanas konjunktīvas maiņiņā uz laiku var rasties neskaidra redze, tāpēc darbības, kas prasa pastiprinātu modrību, var veikt tikai pēc tam, kad šis īslaicīgais efekts izzudis. Ja preparātu nejauši iedzer bērns, sazinieties ar ārstu.

Vienlaikus ar šī preparāta lietošanu pacients nedrīkst lietot mīkstās kontaktlēcas (īpaši hidrofilās). Ja iespējams, preparāta lietošanas laikā nevajadzētu izmantot arī cietās kontaktlēcas; pirms preparāta lietošanas pacientam tās vienmēr ir jāizņem un jāievieto atpakaļ ne agrāk kā 20 minūtes pēc šī preparāta lietošanas.

4. Iespējamās blakusparādības

OCUflash ir labi panesams. Retos gadījumos uzreiz pēc lietošanas var rasties pārejoša vieglas dedzināšanas sajūta. Var rasties arī paaugstinātas jutības reakcija.

Ja Jums rodas šīs blakusparādības vai citas neparastas reakcijas, konsultējieties ar Jūsu ārstu vai farmaceitu.

Mijiedarbība: Līdz šim nav ziņota.

5. Ko OCUflash satur

Natrii chloridum (nātrija hlorīds), 7 mg vienā ml

Palīgvielas: benzalkonii chloridum (benzalkonija hlorīds) 0,04 mg vienā ml (0,004%), dinatrii edetas dihydricus (dinātrija edetāta dihidrāts), kalii chloridum (kālija hlorīds), magnesii chloridum hexahydricum (magnija hlorīda heksahidrāts), polysorbatum 80 (polisorbāts 80), tinctura euphrasiae (Ārstniecības žibulīša tinktūra), borax (nātrija tetraborāts), natrii hydroxidum (nātrija hidroksīds), aqua purificata (attīrīts ūdens).

6. Kā uzglabāt OCUflash un cita informācija

Uzglabāt preparātu temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt vai nesaldēt. Atvērti iepakojumi jālieto līdz 28 dienu laikā.

Uzglabāt preparātu bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot preparātu pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz flakona etiķetes vai kastītes blakus smilšu pulksteņa ikonai. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Iepakojumu izmērs: 1 x 10 ml, 2 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovākija

Tel.: +421 2 4333 3786

Fakss: +421 2 4363 8743

E-pasta adrese: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



2265



Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 2016. gada aprīlis